

Agrotechnické charakteristiky

Odrůda	Ošetření fungicidy	Morfo-regulátor	Pozdní setí	Citlivost na obilní předplodinu
Akteur	2x	1,0-1,5	ANO	NE
Annie	2x	1,5-2,5	ANO	NE
Arkeos	2x	1,5	NE	ANO
Arktis	1x-2x	1,5-2,0	ANO	NE
Athlon	2x	1,0-1,5	ANO	NE
Avenue	1x-2x	0,0	NE	NE
Bernstein	1x-2x	1,0-1,5	ANO	NE
Bodyček	2x	1,5-2,5	NE	NE
Bohemia	1x-2x	2,0-2,5	ANO	NE
Brilliant	1x-2x	0,5-1,0	ANO	NE
Brokat	1x-2x	1,5	NE	NE
Cimrmanova r.	1x-2x	1,0-2,0	NE	NE
Dagmar	2x	1,5	ANO	NE
Dromos	1x-2x	1,0-1,5	ANO	NE
Elixer	2x	1,5	ANO	NE
Elly	1x-2x	2,0-2,5	NE	ANO
Evina	1x-2x	1,5	ANO	NE
Frisky	2x	0,0-1,0	ANO	NE
Genius	2x	1,5	ANO	NE (kromě ječmene)
Golem	1x-2x	1,5-2,0	ANO	NE
Gordian	1x-2x	1,0-1,5	NE	NE
Hermann	1x-2x	1,0	NE	NE
Chevalier	1x-2x	0,0-1,5	NE	NE
JB Asano	2x	1,0-1,5	NE	NE
Julie	1x-2x	1,5-2,0	ANO	ANO
Lavantus	1x-2x	1,2-1,5	ANO	NE
Magister	2x	1,0	ANO	NE
Matchball	1x-2x	1,5-2,5	ANO	NE
Mulan	1x-2x	1,0-1,5	ANO	NE
Nordika	1x-2x	1,5-2,5	ANO	NE
Norin	1x-2x	1,0-1,5	NE	NE
Pannonia NS	1x-2x	0,0-1,0	do 15. 10.	NE
Papageno	2x	0,0-1,0	NE	NE
Patras	2x	1,5-2,0	ANO	NE
Penalta	1x-2x	2,0	NE	NE
Potenzial	1x-2x	1,0-1,5	ANO	NE
Rheia	1x-2x	1,5-2,0	ANO	NE
Rumor	1x-2x	1,0-1,5	NE	NE
Seladon	1x-2x	1,5-2,0	ANO	NE
Tobak	1x-2x	1,5-2,0	ANO	NE
Turandot	2x	1,5-2,0	ANO	NE
Vanessa	1x-2x	1,5-2,5	ANO	NE

Tyto agrotechnické charakteristiky jsou převzaty z materiálů a doporučení jednotlivých firem a jsou pouze orientační. Je třeba zohlednit stav porostu z pohledu vlivu ročníku a odrůdy, intenzity pěstování a infekčního tlaku chorob, neboť počet fungicidních vstupů může být vyšší.