

## Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice jarní (ÚKZÚZ, 2012–2015)

Pekařská jakost		E	E	E	A	A	A	A	A	A	B	B	B
	Průměr standardních odrůd (t.ha <sup>-1</sup> )	KWS Maitra	Astrid	KWS Scirocco	KWS Chamsin	Anabel	Izzy	KWS Akvilon	Tercie	Dafne	Seance	Quintus	Alondra
<b>VÝNOS ZRNA (%)</b>													
neošetřená varianta (N)	7,74	90	88	84	85	92	89	88	88	89	90	94	89
ošetřená varianta (O)	8,97	100	99	97	101	101	100	99	99	99	102	102	101
<b>AGRONOMICKÁ DATA</b>													
Metání – rozdíl od odrůdy Tercie ve dnech		-2	3	-2	-1	0	0	2	76	0	-2	3	-1
Zralost – rozdíl od odrůdy Tercie ve dnech		1	1	-1	1	0	0	1	129	0	0	2	0
Délka rostlin (cm)		93	93	95	90	86	99	93	80	97	90	92	85
Odolnost proti poléhání (9–1)		8	5,5	7	8	6	5	6	8	5	5,5	7	7
Počet produktivních stébel na m <sup>2</sup>		581	569	601	573	640	603	546	577	606	583	606	578
<b>ODOLNOST PROTI CHOROBÁM (9–1)</b>													
Padlí travní na listu		5	6	5	5,5	8	6	8	7	5,5	8	6	8
Padlí travní v klasu		7	7	7	7	8,5	8	8,5	9	7	9	8	8,5
Listové skvrnitosti		5	6	5	5	6	6	6	5	5,5	5	6	5,5
Braničnatka plevová v klasu		6	7	7	7	7	7	7,5	7	7	7	7,5	7
Rez pšeničná		7	6	5,5	6	7	4	7	5	5	6	8	6
Rez plevová		5	6	5	4	8	8	6	7	7	5,5	7	6
<b>KVALITA ZRNA 2012–2014</b>													
Sedimentační test Zelený (ml)		50	49	60	53	48	41	48	46	40	42	48	42
Obsah dusíkatých látek v sušině (%)		13,3	13,3	13,8	13,3	12,9	13,1	13,4	13,1	12,7	12,4	13,2	12,3
Číslo poklesu (s)		348	403	316	346	387	352	334	378	312	369	319	375
Objemová hmotnost (g.l <sup>-1</sup> )		813	793	794	816	802	777	809	802	790	798	786	797
Tvrdość – PSI (%)		12	13	14	12	14	16	14	15	16	15	11	15
Obsah škrobu v sušině (%)		67	68	67	67	68	68	67	68	68	69	68	69
Alveograf – W – deformační energie (10 <sup>-4</sup> J)		327	273	356	373	296	244	291	316	228	274	291	230
Alveograf – P/L – poměrové číslo		1,2	0,9	0,8	1,7	1,5	0,6	0,9	1,3	0,8	1,4	1,4	1,7
Hmotnost tisíce zrn (g)		43	39	48	42	38	41	41	38	39	40	44	40

Pekařská jakost: **E** = elitní; **A** = kvalitní; **B** = chlebová; **C** = nevhodná pro pekařské využití. Bodové hodnocení: **9** = nepoléhavá, odolná proti napadení; **1** = zcela poléhavá, náchylná k napadení.

Varianta pěstování: **N** = neošetřeno fungicidy ani morforegulatory; **O** = ošetřeno fungicidy a morforegulatory, zvýšené dusíkaté hnojení.

Relativní výnosy jsou vztaheny k průměru standardních odrůd Seance, KWS Chamsin, KWS Scirocco v ošetřené variantě (8,97 t/ha).

**Publikováno se souhlasem ÚKZÚZ.**